สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ห่วงใย สุขภาพประชาชน



นายณรงค์ เทพเสนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี



ขอเชิญชวน
พาบุตรหลานอายุไม่เกิน 2 ปี
มารับวัคซีน
PCV

วัคซีน PCV ป้องกันอะไรบ้าง?

- ป้องกันโรคปอดอักเสบ
- ป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- ป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

วัคซีนนี้ดีอย่างไร?

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย
- ลดความรุนแรงของโรค
- ช่วยลดการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อน

สามารถพาบุตรหลานมารับวัคซีน PCV ได้ที่
หน่วยบริการของรัฐทุกแห่ง
ไม่มีค่าใช้จ่าย



เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกหลานไทย

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี


นายประพนธ์ บุญไชย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ
รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี


นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รู้จักวัคซีน PCV
ปกป้องลูกรัก จากปอดอักเสบ

" เด็ก 2–23 เดือน
รับฟรี ใกล้บ้าน "

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง | เริ่มให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2569



เชื้อ **นิวโมค็อกคัส** ติดต่อง่าย ทางละอองไอ จาม จากคนใกล้ชิด เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เสี่ยงป่วยรุนแรงที่สุด อาจเป็น **ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ** หรือ **ติดเชื้อในกระแสเลือด วัคซีน PCV** ช่วยป้องกันได้ และรับได้ **ฟรีตามสิทธิ**

ข้อดี ของการฉีด

- **ป้องกันโรครุนแรง**
  ลดการป่วยหนัก และการนอนโรงพยาบาล
- **ฟรีตามสิทธิ**
  รับได้ที่ รพ.สต. และโรงพยาบาลของรัฐ
- **ฉีดในนัดเดิม**
  พร้อมวัคซีนตามวัย ไม่ต้องมาเพิ่ม
- **มาตรฐานสากล**
  องค์การอนามัยโลก แนะนำทุกประเทศ

ข้อควรรู้

- **อาการหลังฉีด**
  ไข้ ปวด บวม แดง งอแง ส่วนใหญ่หายใน 2–3 วัน
- **ไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์**
  ยังต้องล้างมือ และเลี่ยงคนไอ จาม
- **ต้องฉีดให้ครบ**
  ภูมิคุ้มกันดีที่สุด เมื่อฉีดครบตามนัด
- **งดฉีดบางกรณี**
  เคยแพ้รุนแรง จากเข็มก่อน หรือไข้สูง ให้เลื่อนนัด

ฉีด 3 ครั้ง ฟรี ในนัดเดิม

- **2 เดือน** — เข็มที่ 1 — พร้อมวัคซีนตามวัย
- **4 เดือน** — เข็มที่ 2 — พร้อมวัคซีนตามวัย
- **12 เดือน** — เข็มกระตุ้น — พร้อมวัคซีน LAJE

เข้าใจผิด vs ความจริง

✗ ฉีดหลายเข็ม ในวันเดียว อันตราย	✓ **ปลอดภัย ไม่ลดภูมิคุ้มกัน ฉีดคนละตำแหน่ง**
✗ เป็นหวัดเล็กน้อย ฉีดไม่ได้	✓ **ฉีดได้ ถ้าไม่มีไข้สูง หรือป่วยหนัก**
✗ มาช้า ต้องเริ่มใหม่	✓ **ไม่ต้องเริ่มใหม่ นับเข็มต่อได้เลย**

ดูแลหลังฉีด

- ประคบเย็น บริเวณที่ฉีด
- มีไข้ เช็ดตัว ให้ยาลดไข้ ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่
- ให้ดื่มนม และน้ำ อย่างเพียงพอ

ไข้สูงไม่ลด ซึม ชัก หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ หน้าหรือปากบวม รีบพบแพทย์ทันที

พาลูกมารับวัคซีน PCV ที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน

นำสมุดสีชมพูมาด้วยทุกครั้ง สอบถามวันนัด ได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สแกน QR ดูข้อมูลวัคซีน บนแดชบอร์ด



แดชบอร์ดวัคซีน

อ้างอิง: คำแนะนำการให้วัคซีน PCV กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569 · องค์การอนามัยโลก

งานวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การให้บริการวัคซีนป้องกัน นิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต

(Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)



เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสรุนแรง (IPD) ในเด็กเล็ก ภายใต้การใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุ 2 - 12 เดือน

(วัคซีนสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

ในปีงบประมาณ 2570

สามารถให้วัคซีนเก็บตกครอบคลุมในเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2568

ตามสิทธิประโยชน์ที่สปสช.กำหนด

เป้าหมาย

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

≥ ร้อยละ 90



เริ่มดำเนินการให้บริการวัคซีน PCV ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ชนิดวัคซีนและการเก็บรักษา



ชนิดวัคซีน
PVC10 (SII Pneumosil®)
ครอบคลุม 10 Serotypes
(1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 22F)

อายุที่รับรองให้ใช้
อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 2 ปี
(ก่อนครบรอบวันเกิดปีที่ 2)

ขนาดบรรจุ
5 doses/vial

เก็บที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
(ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด) ต้องเขย่าขวดให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนฉีด
เปิดใช้แล้วอยู่ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ขนาดและวิธีการใช้วัคซีน



ปริมาณ
0.5 ml

วิธีฉีด
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นขา (IM)

ตำแหน่ง
ห่างจากตำแหน่งฉีดวัคซีนอื่นอย่างน้อย 1 นิ้ว (2.5 ซม.)

อาการข้างเคียงที่อาจพบหลังฉีด



- ปวด บวม แดง และร้อนบริเวณที่ฉีด
- หรือมีไข้ คลื่นไส้ ถ่ายเหลว

ระยะเวลา
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และหายได้เองภายใน 2-3 วัน

กำหนดการให้วัคซีน

ใช้สูตร 2p+1 (ฉีดพื้นฐาน 2 เข็ม + เข็มกระตุ้น 1 เข็ม)

เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3
วัคซีนพื้นฐาน เด็กอายุ **2 เดือน**	วัคซีนพื้นฐาน เด็กอายุ **4 เดือน**	วัคซีนกระตุ้น เด็กอายุ **12 เดือน**

หมายเหตุ : กรณีล่าช้าสามารถเก็บตกได้ในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี

แนวทางเบิกจ่ายวัคซีน

เบิกจ่ายผ่านระบบ VMI องค์การเภสัชกรรม (GPO)

1. คลังอำเภอ (CUP) คีย์เบิกผ่านระบบ VMI ตามรอบปกติ
2. GPO อนุมัติและจัดส่งวัคซีนไปยัง คลังอำเภอ (CUP) เดือนละ 1 ครั้ง
3. คลังอำเภอ (CUP) กระจายวัคซีนให้หน่วยบริการในพื้นที่ (หน่วยบริการเบิกผ่านฟอร์ม ว.3/1 ปี 2569)

การบันทึกข้อมูลให้บริการวัคซีน

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HIS → ส่งออก → ผ่านระบบ Moph claim / 43 แฟ้มมาตรฐานในระบบ HDC → การประมวลผล ผ่านฐานข้อมูล HDC (Health Data Center)

รหัสวินิจฉัยโรค ICD-10 คือ Z23.8

รหัสวัคซีนที่ใช้ : ตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐานปี 2569 (กยผ.)

PCV 2 เดือน	PCV 4 เดือน	PCV 6 เดือน	PCV 1 ปี
รหัส P21	รหัส P22	รหัส P23*	รหัส P24

*PCV 6 เดือน กรณีฉีดนอกแผน/ในเด็กกลุ่มเสี่ยงสูง ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

DDC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
The Office of Disease Prevention and Control 11

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ณ วันที่ 26 ต.ค. 2569)

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



นายณรงค์ เทพเสนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการให้บริการวัคซีน PCV
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

กลุ่มเป้าหมาย

- เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 รับวัคซีนตามเกณฑ์ปกติ
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่มารับล่าช้า ให้บริการตามแนวทาง

กำหนดการให้วัคซีน (2p+1)

เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มกระตุ้น
2 เดือน	4 เดือน	12 เดือน

แนวทางการบริการสำคัญ

1. ให้บริการครบถ้วนตามมาตรฐาน ฉีดคนละตำแหน่ง หากใกล้กันให้ห่าง ≥ 1 นิ้ว
2. ผู้ฉีดเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และปฏิบัติตามหลัก 6R
3. สังเกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย 30 นาที และเฝ้าระวัง AEFI
4. บันทึกข้อมูลในแฟ้ม EPI (รหัส P21, P22, P24) และรายงานผ่าน MOPH Claim

การจัดเก็บวัคซีน

- เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °C
- ห้ามแช่แข็ง
- ขวดที่เปิดแล้ว ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง



ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

- แจ้งสิทธิการรับวัคซีน และติดตามเด็กที่พลาดนัด
- ให้ข้อมูลประโยชน์และอาการที่อาจเกิดขึ้น

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กไทยแข็งแรง
ปลอดภัยในอนาคต



บริการด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพเด็กไทย